



La Zeuzère

La Zeuzère du poirier, *Zeuzera pyrina*, est un insecte de l'ordre des lépidoptères, de la famille des Cossidae dont la larve se développe dans le bois des branches et du tronc de plusieurs espèces d'arbres et arbustes. Ce ravageur peut provoquer des dégâts importants sur les arbres fruitiers comme le pommier et le poirier.

L'insecte adulte est un papillon de 50 à 60mm environ devergure chez la femelle ; le mâle, plus petit, mesure de 35 à 40mm. Les ailes sont blanches, parsemées de taches bleuâtres. Le thorax blanc porte six taches bleues.

La larve est une chenille de 50mm de long environ au corps jaune vif marqué de petits points noirs.





Les papillons, qui ne vivent que quelques jours, sont nocturnes. Les femelles pondent leurs œufs surtout en juin sur les arbres, dans les fissures des écorces, ou dans les bourgeons, voire dans la terre. L'éclosion a lieu au bout de trois semaines. Les chenilles pénètrent d'abord dans les parties vertes (feuilles, pétioles) puis effectuent plusieurs migrations. Vers le mois de août, elles creusent des galeries ascendantes dans le bois. Ces galeries sont repérables à l'extérieur par des amas de couleur rouge, formés de sciures et d'excréments. Au printemps suivant, la chenille poursuit le creusement de sa galerie au centre du rameau, affaiblissant fortement celui-ci. La nymphose se produit vers Mai-Juin. Dans les régions plus froides, comme le Nord de la France, le cycle peut s'étaler sur deux ans, les chenilles hibernant un deuxième hiver dans le bois.





